

Što posjednici svinja moraju poduzeti kako bi zaštitili svoje svinje i spriječili širenje bolesti?

- **Obavezno provodite biosigurnosne mjere na svojim objektima!**
- **Odmah prijavite veterinaru svaki znak bolesti u svinja, pobačaje ili uginuća!**
- Svinje **držite u zatvorenom ili ograđenom prostoru** tako da je onemogućen svaki kontakt s divljim svinjama ili drugim životinjama što uključuje i kućne ljubimce!
- Svinje **kupujte samo iz registriranih objekata** sa svom potrebnom veterinarskom dokumentacijom!
- **Novonabavljene svinje držite odvojeno** od drugih svinja na objektu!
- **Ne dopuštajte ulazak neovlaštenim osobama i posjetiteljima** na vaš objekt i ne dopuštajte da dolaze u kontakt sa svinjama!
- Na odgovarajući način **zbrinite kruti gnoj i gnojevku** koja nastaje tijekom držanja svinja na način da se spriječi svako otjecanje gnojevke i otpadnih voda izvan objekta!
- **Ne hranite svinje napojem** (kuhinjski ili restoranski otpad s ostacima hrane životinjskog podrijetla)!
- Na odgovarajući način **neškodljivo uklonite otpad nastao klanjem svinja za vlastite potrebe** da se spriječi kontakt drugih životinja s otpadom!
- **Ne donosite meso ili mesne proizvode** iz drugih država koje su zaražene s ASK ili iz dijelova Republike Hrvatske koji su pod ograničenjima, kako ne bi došlo do širenja virusa ASK!

Više informacija o ASK dostupno je na:

mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane: <http://www.veterinarstvo.hr>

E-mail adresi: veterinarstvo@mps.hr ili na dežurnom telefonu za afričku svinjsku kugu 099/4392-507

Što lovci moraju poduzeti kako bi spriječili pojavu i širenje bolesti?



Lovci moraju prijaviti svako neuobičajeno ponašanje ili pojavu znakova bolesti na divljim svinjama te svaku uginulu divlju svinju uključujući i divlje svinje stradale u prometu i lešine u stanju raspadanja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se provelo laboratorijsko pretraživanje na ASK. Uginule divlje svinje u lovištu se moraju aktivno tražiti.

Svako lovište mora imati izrađen Plan biosigurnosti.

Biosigurnost u lovištu uključuje minimalno:

- dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova
- vozila koja se koriste u lovištu, posebno ona koja se koriste za prijevoz trupova odstrijeljenih divljih svinja, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana

Izbjegavajte kontakt s domaćim svinjama nakon lova!

U zonama ograničenja zabranjeno je sudjelovanje u lovu na divlje svinje ili obavljanje ikakvih aktivnosti vezano za žive ili mrtve (uginule ili odstrijeljene) divlje svinje, za sve članove domaćinstva i osoblja na objektima na kojima se drže svinje !



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Afrička svinjska kuga Ozbiljna prijetnja svinjogojstvu

Kakva je bolest afrička svinjska kuga?

Afrička svinjska kuga (ASK) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja uzrokuje velike ekonomske gubitke u sektoru svinjogojstva. Bolest je prvobitno bila ograničena na područje Afrike, odakle se 2007. godine proširila na područje Gruzije te daljnjom tendencijom širenja na zapad (obuhvaćajući istočnu i središnju Europu) i na istok. 2014. godine se prvi puta pojavila na području Europske unije.

Bolest je prisutna u susjednim državama, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Od lipnja 2023. godine prisutna je na području Republike Hrvatske.

Koje vrste životinja mogu oboljeti?

Od ASK obolijevaju isključivo domaće i divlje svinje.

Da li je bolest opasna za ljude i druge životinje?

Ne! Virus ASK ne uzrokuje bolest u ljudi niti u drugih životinja.

Postoji li cjepivo ili liječenje ASK?

Za ASK nema cjepiva niti učinkovitog lijeka.

Što znamo o uzročniku ASK?

Uzročnik ASK je virus koji je vrlo otporan i može preživjeti dulji vremenski period (mjesecima, pa čak i godinama) u okolišu, izmetu, mesnim proizvodima (zamrznutim, soljenim, dimljenim ili nedovoljno termički obrađenim) i lešinama uginulih svinja.

Međutim, virus učinkovito uništavaju dezinfekcijska sredstva na bazi 1% formaldehida, 2% NaOH ili parafenil fenola koji su komercijalno dostupni te učinkoviti kada se koriste prema uputi proizvođača.

Kako se prenosi ASK?

Divlje i domaće svinje mogu se međusobno zaraziti izravnim kontaktom kao i kontaktom s virusom prisutnim u okolišu. Svinje se mogu zaraziti i konzumiranjem nedovoljno termički obrađenih proizvoda od svinjskog mesa, strvina ili napoja. Do zaraze vrlo često dolazi neizravnim putem kontaminiranim vozilima, obućom, odjećom, alatom i opremom za što je odgovoran ljudski faktor.

Koji su klinički znakovi bolesti?

ASK se u svinja manifestira nespecifičnim kliničkim znakovima. Svinje najčešće imaju visoku tjelesnu temperaturu (više od 40° C) i crvenilo po tijelu i sluznicama. U uzgoju svinja bolest se javlja pojedinačno pa se u skupini svinja prvo primjećuju pojedinačna uginuća te crvenilo kože u uginulih svinja, bez drugih znakova bolesti u ostalih svinja iz skupine. Ako se u objektu drže krmače vrlo često virus napada prvo njih, najčešće prije, tijekom ili nakon prašjenja. Druge svinje u objektu izgledaju potpuno zdravo. U narednom razdoblju virus se nastavlja širiti unutar uzgoja te se javljaju uginuća i uočavaju klinički znakovi bolesti u drugih svinja: povišena tjelesna temperatura, potištenost, gubitak apetita, crvenilo kože, točkasta krvarenja po koži, cijanoza kože, proljev (krvavi proljev) i daljnja uginuća.

Fotografije iz epidemije ASK u Republici Hrvatskoj



Povišena tjelesna temperatura, potištenost



Crvenilo kože, krvarenja po koži i cijanoza



Povećana slezena

